

دستورات بعد از انجام عمل IVF و سندرم پرکاری تخمدان

- ۱- کپسول سفکسیم روزانه یک عدد میل شود. (تا 5 روز)
- ۲- قرص اسید فولیک، متفورمین و **ASA** ادامه یابد.
- ۳- شیاف پروژسترون هر ۱۲ ساعت یک عدد واژینال استعمال شود.
- ۴- جهت اطلاع از تشکیل و زمان انتقال جنین ، ۲۴ ساعت بعد از عمل با شماره تلفن **77883283** داخلی **۲۲۸۹** تماس گرفته شود.
- ۵- در یک تا دو روز اول بعد از عمل احتمال بروز حالت‌هایی همچون سرگیجه یا تهوع وجود دارد که از عوارض بیهوشی می باشد که طبیعی است.
- ۶- وجود لکه بینی و یا خونریزی به مقدار بسیار کم طبیعی است .
- ۷- در صورت بروز علائمی مثل درد شدید شکمی ، درد تخمدانها، تهوع و استفراغ، تنگی نفس، ورم شکمی، کاهش حجم ادرار و افزایش سایز شکم حتما" به بیمارستان مراجعه نمایید.
- ۸- مصرف حبوبات و میوه و سبزیجات خام تا زمانیکه نفخ شکمی وجود دارد ممنوع است.
- ۹- خوردن فراوان مایعات به ویژه آب میوه های طبیعی، سفیده تخم مرغ آب پز و خوردن غذا در حجم کم و دفعات بیشتر به کاهش علائم کمک می کند.