

افزایش جمعیت جوان با نشاط و سالم سرمایه ای برای آینده میشود.

آموزش حین ترخیص بیماران حاملگی خارج رحمی:

- در صورت تشدید درد زیر شکم و تهوع و استفراغ و دردی که به ناحیه شانه انتقال میابد و ضعف و بی حالی و سرگیجه سریعاً به نزدیکترین مرکز اورژانس محل زندگی مراجعه شود.
- در حاملگی خارج رحمی بعد از ترخیص انجام آزمایش تیتر بتا (تست بارداری) و پیگیری جواب آن و مراجعه به پزشک جهت رویت جواب آزمایشات بسیار ضروری و مهم است و ادامه اندازه گیری تست بتا تا زمان صفر شدن هفته ای یک بار الزامی است.
- در صورت دریافت داروی MTX مراقبتهای آموزشی داده شده در بخش مانند رعایت رژیم غذایی و اجتناب از قرار گرفتن در معرض نور مستقیم افتاب و از مصرف مسکن ها خود داری کنید و مراجعه در صورت هر گونه مشکل به بیمارستان.
- در بیماران حاملگی خارج رحمی که تحت عمل جراحی قرار گرفته اند تا زمان صفر شدن تیتر بتا نباید باردار شوند.
- در عمل حاملگی خارج رحمی که لوله تخمدان خارج نشده است و فقط محصول حاملگی خارج شده است تا صفر شدن تیتر بتا انجام بتا تیتر هفته ای یک بار الزامی است.

آموزش حین ترخیص بیماران مول:

- در بیمارانی که تحت ساکشن کورتاژ مول قرار گرفته اند تا صفر شدن تیتر بتا هفته ای یک بار انجام میشود.
- جواب پاتولوژی ۱۴ روز بعد پیگیری به رویت پزشک برسد.
- تا زمان صفر شدن تیتر بتا نباید بارداری صورت بگیرد.
- روز سوم تا پنجم بعد از ترخیص پیامک لینک نظر سنجی برای شما ارسال میشود که میتوانید نظرات و پیشنهادات خود را در این لینک ثبت کنید.